

NEOTRAVISIL®

Citron et miel

Composition :

Chaque pastille de 2,5 g contient :

1- Pudina (Mentha viridis)	: 5,75 mg
2- Yashtimadhu (Glycyrrhiza glabra)	: 2,2 mg
3- Taila parni (Eucalyptus globulus labill)	: 1,5 mg
4- Mishtanimbu phala (Citrus sinensis)	: 0,5 mg
5- Karpura (Cinnamomum camphora Nees & Eberm)	: 0,18 mg
Excipients (Sucre, Glucose liquide, Eau purifiée,	: q.s.
Tartrazine supra jaune (colorant), Arôme de miel,	
Arôme de citron).	

Propriétés nutritionnelles :

Neotravisil® Citron et Miel aide à soulager :

- Tous types de toux allergique, d'origine infectieuse ou asthmatique
- Toux associée au reflux gastro-oesophagien
- Toux du chanteur et toux de l'orateur

Ce produit est un **complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.**

Les compléments alimentaires ne peuvent être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié.

Posologie et mode d'administration :

Par voie orale

Adultes (18 ans et plus) - Prendre une pastille chaque 3-4 heures, ne pas dépasser 6 pastilles par jour. La pastille doit être placée dans la bouche et retenue jusqu'à dissolution. Ne pas manger ou boire 5 min après la prise de la pastille.

Enfants (6 – 12 ans) - Prendre une pastille chaque 3-4 heures, ne pas dépasser 3 pastilles par jour. La pastille doit être placée dans la bouche et retenue jusqu'à dissolution. Ne pas manger ou boire 5 min après la prise de la pastille.

Durée d'utilisation : 1 à 2 semaines

Contre-indications et précautions :

Hypersensibilité à l'un des composants de la formule

Eviter l'utilisation à long terme.

Ce produit contient le colorant Tartrazine E102 et peut provoquer des réactions allergiques.

Les pastilles de Neotravisil® citron et miel contiennent du sucre, il est recommandé de

l'utiliser avec précaution chez les patients atteints de diabète sucré.

Administrer avec précaution chez les patients hypertendus, atteints d'affection rénale ou hépatique.

L'utilisation de Neotravisil® n'est pas recommandé chez les patients pédiatriques et la femme en enceinte ou allaitante.

Effets indésirables :

Les effets indésirables sont rares si Neotravisil® est pris aux doses recommandées.

Interactions Médicamenteuses:

Les médicaments qui sont métabolisés par l'enzyme CYP450 accélèrent le métabolisme des produits co-administrés

Conservation :

Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière

Conserver à une température inférieure à 30°C.

Tenir hors de la portée des enfants.

Présentation :

Neotravisil® Citron et Miel pastilles sont disponibles en boîtes de 24, conditionnées en 2 blister de 12 pastilles

Fabriqué par:

Lozen Pharma Pvt. Ltd.

Raghav Estate, KISSIDC

Industrial Estate, Shiggaon Road

Savanur 581 118,

State: Karnataka, Inde

PM000963

Distribué au Maroc par:

SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC

219, Boulevard Zerktoni,

Angle Boulevard Roudani 5ème étage

CP 20330 El Maarif, Casablanca, Maroc

06/2020-A